

Soins douloureux

Guide pratique des antalgiques : le bon médicament au bon moment

	Spécialités	0 min	15 min	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min	105 min	2 h				3 h				4 h				5 h				6 h
Palier 1	DOLIPRANE® : paracétamol <i>PO</i>																									
	PERFALGAN® : paracétamol <i>IV</i>																									
	PROFÉNID® : kétoprofène <i>PO</i>																									
	PROFÉNID® : kétoprofène <i>IV</i>																									
	PROFÉNID® : kétoprofène <i>IM</i>																									
Palier 1-2	ACUPAN® : néfopam <i>IV</i>																									
	ACUPAN® : néfopam <i>PO</i>																									
Palier 2	DALFALGAN CODEINE® : paracétamol + codéine <i>PO</i>																									
	LAMALINE® : opium + paracétamol + caféine <i>PO</i>																									
	TOPALGIC® : tramadol <i>PO</i>																									
	IXPRIM® : tramadol + paracétamol <i>PO</i>																									
Palier 3	CHLORHYDRATE de MORPHINE <i>IV</i>																									
	ACTISKÉANAN® : sulfate de morphine <i>PO</i>																									
	OXYNORM® : oxycodone <i>PO</i>																									
	TEMGESIC® : buprénorphine <i>VS</i>																									
	ABSTRAL® : fentanyl <i>VS</i>																									
	EFFENTORA® : fentanyl <i>VS</i>																									
	INSTANYL® : fentanyl <i>VN</i>																									
Autres	XYLOCAÏNE® 5% NÉBULISEUR sol pour pulvérisation buccale <i>AL</i>																									
	EMLAPATCH® 5% pansement adhésif cutané <i>AL</i>																									

LÉGENDE

Début de l'effet antalgique

Effet antalgique optimal

ABRÉVIATIONS

PO : per os
IM : voie intramusculaire
IV : voie intraveineuse
AL : anesthésie locale
VS : voie sublinguale
VN : voie nasale
sol : solution

Soins douloureux

Guide pratique des antalgiques : le bon médicament au bon moment

Cas particuliers

	Spécialités	0 min	15 min	30 min	45 min	60 min	75 min	90 min	105 min	2 h				3 h				4 h				5 h				6 h
Palier 1	ASPÉGIC® ORAL : acétylsalicylate de lysine <i>PO</i>																									
	ASPÉGIC® INJECTABLE : acétylsalicylate de lysine <i>IM-IV</i>																									
Palier 3	SOPHIDONE LP® : hydromorphone <i>PO</i>																									
	SKÉANAN® LP : sulfate de morphine <i>PO</i>																									
	OXYCONTIN® LP : oxycodone <i>PO</i>																									
	MÉTHADONE CHLORHYDRATE (AP-HP) : méthadone <i>PO</i>																									
Autres	XYLOCAÏNE® : lidocaïne <i>sol injectable AL</i>																									
	XYLOCAÏNE® VISQUEUSE 2% : lidocaïne <i>gel oral AL</i>																									
	XYLOCAÏNE® 2% : lidocaïne <i>gel urétral stérile AL</i>																									
	CHIROCAÏNE® : lévobupivacaïne <i>sol injectable AL</i>																									

LÉGENDE

Début de l'effet antalgique

Effet antalgique optimal

ABRÉVIATIONS

PO : per os
IM : voie intramusculaire
IV : voie intraveineuse
AL : anesthésie locale
cp : comprimé
sol : solution

- KALINOX® : mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote (MéOPA) :
- délai d'action : 3 min
 - arrêt de l'effet quelques minutes après l'arrêt de l'administration
 - durée maximale d'administration conseillée : 1h