

# Arthralgies et myalgies

1

**SOUS PYOSTACINE®  
(pristinamycine)**

# PYOSTACINE® (Pristinamycine)

2

- **Antibiotique** de la famille des streptogramines
- **Indications** :
  - ✦ Certaines infections ORL : sinusites, exacerbations bronchiques, pneumonies
  - ✦ Infections de la peau et des tissus mous
- **Effets indésirables** mentionnés dans le RCP
  - ✦ Troubles gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée, pesanteur gastrique
  - ✦ Atteintes cutanées : pustulose exanthématique aiguë généralisée, eczéma, purpura vasculaire, éruptions bulleuses
  - ✦ Hypersensibilité

# Enquête de PV par le CRPV de Lille

3

- 15 cas d'arthralgies et de myalgies extraits de la BNPV
- 9 femmes et 6 hommes soit ratio H/F : 0,66
- Âge moyen : **60,5 ans**
- Pristinamycine seul médicament potentiellement incriminé dans 7 cas
- **7 cas graves** ayant nécessité une hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation
- Délai de survenue des symptômes : **1 à 9 jours**
- Amélioration des symptômes à l'arrêt du traitement dans **11 cas/15 (73,3 %)**
- Rechallenge positif dans 2 cas

# Conclusion

4

- **Évaluation difficile** à partir des données de pharmacovigilance et de la **sous-notification**
- Population concernée (60 ans) présente des douleurs articulaires souvent associées au vieillissement
- EI « *arthralgies et myalgies* » rapportés avec des antibiotiques de la même famille commercialisés aux Etats-Unis
- EI à prendre en compte dans la pratique courante