

# Cas marquant

1

## JANUVIA et tendinite

# Januvia 50 et 100 mg comprimé pelliculé

2

- **Sitagliptine**
- Inhibiteur de la dipeptidylpeptidase [DPP-4]
- Indiqué chez les patients **diabétiques de type 2**
  - ✦ En monothérapie avec régime alimentaire et exercice physique
  - ✦ En bithérapie avec metformine ou sulfamide hypoglycémiant
  - ✦ En trithérapie
  - ✦ En addition à l'insuline
- Administré une fois par jour au cours ou en dehors d'un repas

# Effets indésirables

3

- **Hypoglycémies** fréquentes → adapter l'insuline ou le sulfamide hypoglycémiant en cas d'association à la sitagliptine
- Céphalées fréquentes
- **Affections musculosquelettiques** : fréquence indéterminée
  - ✦ Arthralgie
  - ✦ Myalgies
  - ✦ Douleur dorsale
  - ✦ Arthropathie

# Cas marquant

4

- Patient de 69 ans traité par Januvia depuis le 13/06/2016
- 22/06/2016:
  - ✦ Apparition d'une douleur au talon droit
  - ✦ Puis tendinite achilléenne droite traitée par orthèses, ondes de choc, acupuncture et kinésithérapie
  - ✦ Suivie d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un démarrage rapide → chirurgie le 12/12/2016
- 27/12/2016: switch vers Diamicron

# Conclusion

5

- **Cas dans la BNPV avec chronologie évocatrice**
  - ✦ Apparition rapide après introduction de la gliptine d'une tendinopathie souvent bilatérale
  - ✦ Sans autre médicament suspect
- **Modifier le RCP au niveau des EI ou des précautions d'emploi**
  - ✦ Risque de tendinopathies
  - ✦ Notamment en association avec autres molécules pourvoyeuses