

# Cas marquant du CTPV



Pneumopathie interstitielle

Sous

Bicalutamide (CASODEX®)

# Pneumopathie interstitielle médicamenteuse

---

- ❑ Représente 3% des pneumopathies interstitielles
- ❑ Facteurs aggravants : **radiothérapie, BPCO**
- ❑ Variété de fibrose pulmonaire avec un épaississement des cloisons interalvéolaires et une accumulation de phospholipides intracellulaires
- ❑ Signes cliniques
  - ❑ Dyspnée, toux, douleurs thoraciques, amaigrissement
- ❑ Pathologie rare, mais grave en l'absence d'arrêt du traitement en cause
  - ❑ Amiodarone, nitrofurantoïne, chimiothérapies, MTX, anti TNF $\alpha$ , sirolimus, ...

# RCP du Bicalutamide (CASODEX®)

---

- ❑ Indiqué dans le **cancer de la prostate**
- ❑ PE : risque d'atteinte hépatique → arrêt si transaminases > 3N
- ❑ IM : anticoagulants coumariniques → contrôle de l'INR
- ❑ EI les plus fréquents : gynécomastie, bouffées de chaleur, prurit, sécheresse cutanée, asthénie, nausées, ...
- ❑ Seulement **dyspnée** concernant le système respiratoire

# Cas du CRPV présenté au CTPV

---

- Homme de 82 ans
- Traité pour un cancer de la prostate pendant 11 mois avec Bicalutamide
- ATCD : LLC
- A présenté une pneumopathie interstitielle
- Arrêt du CASODEX, traitement par corticoïdes et oxygène dans un tableau de dyspnée asphyxiante
- → décès au bout d'un mois

# Analyse et propositions

---

- Nombre de cas dans BNPV : 4 cas
- Nombre de cas dans Eudravigilance: 3 cas
- Bibliographie : décrit dans Micromedex
- Terme « *pneumopathie interstitielle* » rapporté dans le RCP de flutamide (ex EULEXINE®), nilutamide (ANANDRON®) mais pas dans celui d'enzalutamide (XTANDI®)
- → Demande **d'ajout de cet EI dans le RCP** de bicalutamide