



# PYOSTACINE®

---

pristinamycine



# Effets indésirables

---

- Accidents cutanés graves (Lyell, purpuras, réactions anaphylactiques,...)
- Cytopénies sur toutes les lignées
- Nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux



# Mises en garde

---

- Non adapté au traitement des angines
- Données limitées pour les otites
- Réactions d'hypersensibilité graves avec mise en jeu du pronostic vital

# Comité technique du 10/12/2013



---

- Prescriptions hospitalières essentiellement réservées aux « grosses » bronchites chroniques
- Augmentation des ventes en ville (allergie aux autres antibiotiques ?)  
→ 6 millions de boîtes en 2012



# Restrictions des indications

---

- Sinusites maxillaires aiguës
- Exacerbations aiguës de bronchites chroniques
- Pneumonies communautaires de gravité légère à modérée
- Infections de la peau et des tissus mous



# Posologies revues

---

- Chez l'adulte:
  - 1g 2 fois/jour pendant 4 jours
  - à 1g 3 fois/jour pendant 8 à 14 jours
  - 4g/jour dans les cas sévères
- Chez l'enfant :
  - 50mg/kg/jour en 2 ou 3 prises sans dépasser la posologie adulte