


Cas marquants du Comité technique du 20 octobre 2015



- ALIMTA et œdème des paupières
 - AUBAGIO et métrorragies
- Doxycycline et troubles pigmentaires

ALIMTA (pémétréxed)



Œdèmes des paupières


ALIMTA (pémétrexed)

- ❑ Agent antinéoplasique
- ❑ Indiqué dans
 - ❑ Mésothéliome pleural malin
 - ❑ **Cancer bronchique non à petites cellules**
- ❑ En perfusion IV de 10 min. le 1^{er} jour de chaque cycle de 21 jours
- ❑ Effets indésirables les + fréquents:
 - ❑ **Dépression médullaire** à type d'anémie, neutropénie, leucopénie, thrombopénie
 - ❑ **Toxicités gastro-intestinales** à type d'anorexie, nausées, vomissements, diarrhées, constipation, pharyngite, mucite et stomatite.

EI non mentionné dans RCP

- **Œdèmes des paupières**
 - 5 articles publiés dans la littérature
 - Une dizaine de cas dans la BNPV
 - Importance de connaître cet EI
 - Problème d'errance diagnostique
 - Gêne esthétique et fonctionnelle
- } → **Chirurgie**
- **Régression à l'arrêt du traitement par ALIMTA**

AUBAGIO (tériflunomide)



Métrorragies

AUBAGIO (Térimflunomide)

- ❑ Immunosuppresseur sélectif
- ❑ Indiqué dans les formes rémittentes de **sclérose en plaques**
- ❑ Sous forme de comprimés à 14 mg administrés en une prise par jour
- ❑ Effets indésirables les + fréquents:
 - ❑ Grippe, infection des voies respiratoires supérieures, infections des voies urinaires, paresthésies, augmentation des ALAT
 - ❑ Diarrhée, nausées et alopécie sont transitoires nécessitent rarement l'arrêt du traitement
 - ❑ Des **ménorragies** sont signalées comme fréquentes

EI non mentionné dans le RCP

❑ **Métrorragies**

- ❑ 4 cas dans Vigilyze et un cas de saignement en dehors de la période menstruelle
- ❑ Patiente de 37 ans traitée par AUBAGIO depuis 1 an
- ❑ Mi-septembre : métrorragies abondantes → anémie
- ❑ Pose d'un stérilet, rejeté quelques jours après à cause des saignements importants
- ❑ Hystéroscopie → saignements importants en nappe
- ❑ Arrêt de l'AUBAGIO → évolution favorable

Doxycycline



Troubles pigmentaires

Doxycycline

- ❑ Antibiotique de la famille des tétracyclines
- ❑ Administré par voie orale au milieu d'un repas avec un verre d'eau au moins 1 heure avant le coucher
- ❑ Effets indésirables les + fréquents:
 - ❑ Réactions allergiques, *hypertension intracrânienne*, *dyschromie dentaire*, troubles digestifs, survenue possible de *dysphagie*, *œsophagite*, ...troubles hématologiques
 - ❑ **Affections de la peau** de type, *photosensibilisation*, rash, très rares cas d'érythrodermie

EI non mentionné dans le RCP

- ❑ Patiente de 88 ans traitée pour une infection chronique de prothèse totale de hanche
- ❑ → **Pigmentation cutanée non réversible** (4 ans après le début du traitement)
- ❑ Dans Martindale: pigmentation cutanée et autres tissus avec la tétracycline (rare)
- ❑ Pas de cas dans la BNPV
- ❑ Quelques cas de troubles pigmentaires dans la littérature